

## 緊急傷病送醫優先順序參考

<p>極重度：1 級 （危及生命）臨床表徵(需立即處理)</p>	<p>重度：2 級 （緊急）臨床表徵(需在 30-60 分內處理完畢 )</p>
<p>指死亡或瀕臨死亡。</p> <p>心搏停止、休克、昏迷、意識不清、急性心肌梗塞、心搏過速或心室顫動、疑為心臟病引起之胸痛、呼吸窘迫、呼吸道阻塞、連續性氣喘狀態、癲癇重積狀態、頸〈脊椎〉骨折、嚴重創傷，(如車禍、高處摔下、長骨骨折、骨盆腔骨折)、肢體受傷合併神經血管受損、大的開放性傷口、槍傷、刀刺傷、溺水、重度燒傷、對疼痛無反應、低血糖、無法控制的出血等</p>	<p>重傷害或傷殘。</p> <p>呼吸困難、氣喘、骨折、撕裂傷動物咬傷、眼部灼傷或穿刺傷、中毒、闌尾炎、腸阻塞、腸胃道出血、強暴</p>
<p>中度：3 級 （次緊急）臨床表徵</p> <p>(須在 4-6 小時內完成醫療處置 )</p>	<p>輕度：4 級 （非緊急）臨床表徵(需門診治療 )</p>
<p>建議需送至校外就醫。</p> <p>脫臼、扭傷</p> <p>切割傷需縫合</p> <p>腹部劇痛</p> <p>單純性骨折</p> <p>無神經血管受損者</p>	<p>發燒 38 度以上</p> <p>輕度腹痛、腹瀉、嘔吐、、頭痛、昏眩</p> <p>休克徵象等</p> <p>疑似傳染病</p> <p>慢性病急性發作擦藥、包紮、休息即可繼續上課者。</p>

資料出處於:學校衛生工作指引